

MEDICAMENTOS QUE **PODEM SER USADOS** E OS **CONTRAINDICADOS** NA DOENÇA DE PARKINSON

FINALIDADE	MEDICAÇÕES SEGURAS (princípio ativo)	EVITAR AS MEDICAÇÕES (princípio ativo)
Antipsicóticos	<ul style="list-style-type: none"> • Quetiapina • clozapina 	EVITAR todos os outros anti- psicóticos típicos e atípicos
Medicamentos para dor	A maioria é segura para usar, mas medicações soníferas podem causar confusão ou psicoses e constipação.	Se o paciente estiver tomando inibidor da MAO-B como selegilina ou rasagilina (ainda indisponível no Brasil), EVITAR: <ul style="list-style-type: none"> • meperidina
Anestésicos	Marque consulta com um anestesista, e neurologista (especialista em distúrbios de movimentos), para determinar o melhor anestésico a ser utilizado	Se o paciente estiver tomando inibidor da MAO-B como selegilina ou rasagilina, EVITAR: <ul style="list-style-type: none"> • meperidina • tramadol • droperidol • methadona • propoxifeno • ciclobenzaprina • halotano
Medicamentos para náusea e trato gastrointestinal	<ul style="list-style-type: none"> • domperidona • trimetobenzamida • ondansetrona • dolasetrona • granisetrona 	<ul style="list-style-type: none"> • proclometazina • metoclopramida • prometazina • droperidol
Antidepressivos	<ul style="list-style-type: none"> • fluoxetina • sertalina • paroxetina • citalopram • escitalopram • venlafaxina 	<ul style="list-style-type: none"> • amoxapina

Alerta Especial: alguns medicamentos como benzodiazepínicos, relaxantes musculares, medicamentos para controle da bexiga e outras medicações usadas para o sono e dor podem causar confusão, alucinações e outros sintomas.

“COMPARTILHE ISTO COM O SEU MÉDICO”

ATENÇÃO: ESPECÍFICO PARA PACIENTES QUE FIZERAM CIRURGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO DE DBS

Se você tem um dispositivo de Estimulação Cerebral Profunda (DBS), determinadas precauções devem ser tomadas para realização do exame de ressonância magnética.

- O exame de ressonância magnética não deve ser feito ao menos que o hospital tenha experiência na realização deste procedimento de captura de imagens em pacientes com DBS ajustado para 0.0 volts.
- O exame de ressonância magnética nunca deve ser feito se o marcapasso estiver localizado no abdômen ou abaixo e o exame de ressonância magnética não pode ser utilizada para imagem de estruturas das partes do corpo mais baixas do que a cabeça (pescoço, abdômen, braços, pernas ou abaixo) já que um aquecimento perigoso do chumbo pode ocorrer.

Precauções com eletrocardiograma e eletroencefalograma:

- Desligue o dispositivo de DBS antes de realizar o eletrocardiograma ou eletroencefalograma;
- A diatermia deve ser evitada.

Fonte:

National Parkinson Foundation (Aware in Care of Parkinson's Disease)

Tradução Carolina Nobre – UFG

Correção e Adaptação: Danielle Ianzer – Projeto Vibrar Parkinson